

## Cefaleia? Não é apenas uma, são muitas! *Headache? It is not one, they are many!*

A International Headache Society (IHS) criou critérios<sup>(1)</sup> para o diagnóstico de cerca de 200 tipos e subtipos de cefaleias, algumas ditas primárias (sem uma causa aparente identificável) e outras classificadas como de origem secundária. Porém, vários outros tipos e subformas de cefaleia permanecem sem o reconhecimento da IHS, como a *epicrania fugax* descrita recentemente.<sup>(2)</sup> Acreditamos que ainda há muito para se trabalhar no sentido de reconhecimento de várias outras formas de cefaleia ainda não catalogada como entidade oficial.

Nesta edição da *Headache Medicine* Valença e colaboradores estão lançando critérios para uma nova forma de cefaleia que está associada com a paralisia facial idiopática de Bell. Com isso se pretende tornar possível a identificação da cefaleia precocemente antes do desenvolvimento da paralisia facial, tratando o paciente no sentido de prevenir ou atenuar o déficit motor. Estima-se que um em cada 60 indivíduos vai desenvolver uma paralisia facial periférica ao longo da vida. Portanto, a cefaleia retroauricular típica da paralisia de Bell deve ser melhor estudada.

O leitor vai encontrar vários outros artigos abordando diferentes temas na área da cefaleia, como dor orofacial crônica, cefaleia no idoso, cefaleia e doença celíaca, e relação entre cefaleia, transtorno mental comum e qualidade de vida.

### References

1. The International Classification of Headache Disorders, 3rd edition (beta version). *Cephalalgia*. 2013 Jul;33(9):629-808.
2. Cuadrado ML, Ordas CM, Sanchez-Lizcano M, Casas-Limon J, Matias-Guiu JA, Garcia-Garcia ME, et al. Epicrania fugax: 19 cases of an emerging headache. *Headache*. 2013 May;53(5):764-74.

Marcelo M. Valença  
Universidade Federal de Pernambuco